

갯쇠보리



▶ 갯 쇠보리(털 쇠보리, 개 쇠보리)

□ 외떡잎식물 벼목 벼과 쇠보리속 여러해살이풀	
□ 학명	<i>Ischaemum antheplhoroides</i> (Steud.) Miquel
□ 분류	Gramineae(벼과)
□ 일어명	ケカモノハシ
□ 영문명	
□ 분포지역	한국(중부이남), 일본, 중국
□ 자생지	바닷가 모래땅
□ 크기	높이 30~80cm
□ 개화 및 결실기	7~8월 개화
□ 꽃색	
□ 잎	잎은 호생, 선상 피침형, 편평함, 길이 15~30cm, 나비 8~12mm, 양면과 엽초에 긴털이 밀생, 잎혀는 길이 2mm가량, 막질, 갈색, 절두형 또는 2개 내지 여러개로 잘게 갈라짐, 잔털이 있음
□ 꽃	꽃은 7월에 폼, 꽃차례는 밑부분과 마디에 털이 있음, 반원기둥의 꽃이삭 2개가 합쳐져서 1개로 보임, 길이 6~12cm, 긴 털이 있음, 작은이삭은 각 마디에 2개씩 달림, 길이 7~8mm, 넓은 난형, 뒷면에 긴 털이 밀생, 포영은 막질, 5~10맥, 호영은 끝이 2개로 갈라짐, 포영 길이의 2배 정도의 까락이 도움(까락의 길이 10mm), 쇠보리에 비해 전체에 털이 많음
□ 줄기	높이 30~80cm, 밀생, 털이 없거나 마디와 화서 밑에 짧은 털 있음, 밑 부분의 마디에서 굵은 뿌리가 내림, 가지가 많이 갈라지고 비스듬히 자람
□ 기타특징	염색체 수 2n=68, 72
□ 이용현황	